

Приложение 1

Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий в жилых помещениях для лиц, находящихся в домашней изоляции.

Для обеспечения безопасного пребывания в квартире, доме, иных помещениях лиц, находящихся на самоизоляции необходимо:

- проводить влажную уборку не менее 2 раз в день с применением обычных средств, предназначенных для уборки помещений. Особое внимание следует уделить туалету, ванной, кухне. При проведении уборки необходимо соблюдать следующую последовательность: жилая комната - кухня- ванная-туалет. Салфетки, тряпки после уборки следует тщательно промыть в моющем средстве и высушить. Если есть возможность, следует использовать одноразовые салфетки, тряпки, ветошь,

- протирать дезинфицирующим раствором 1 раз, в конце дня, поверхности, к которым прикасаются чаще всего - дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.,

- кухонную посуду, утварь вымыть с использованием обычных моющих средств, после чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов. При использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется,

- обработать кожным антисептиком руки после проведения уборки,

- обработать дезинфекционным средством, кожным антисептиком поверхности пакетов, другой упаковки в случае, если они были доставлены лицу, находящемуся на самоизоляции, после чего обработать руки кожным антисептиком,

- проводить проветривание всех помещений - постоянное или периодическое, в зависимости от погодных условий.

Стирку белья следует проводить в обычном режиме, при температуре воды 60 градусов.

Для проведения дезинфекции следует использовать дезинфекционные средства, предназначенные для обеззараживания поверхностей в соответствии с инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных средств можно использовать отбеливатели для белья - хлорные и кислородные. На этикетки отбеливателей есть указание как приготовить раствор отбеливателя для дезинфекции. При отсутствии такой информации, для приготовления дезинфицирующего раствора следует взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды, или одна столовая ложка на стакан теплой воды. Раствор тщательно перемешать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза!

Не следует готовить сразу большое количество дезинфицирующего раствора, на один-два дня достаточно 0,5 - 1 литра.

Приготовленный раствор следует хранить в темном месте, в хорошо закрытой емкости. Проведение дезинфекции следует проводить в перчатках. Про-

дезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть салфеткой, смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисептика нужно мыть руки водой с мылом, тщательно намыливая все руки в течение 15-20 секунд, а затем смывая теплой водой.

После завершения периода домашней изоляции режим уборки и дезинфекции можно продолжить, сократив их периодичность.

В случае, если у лица, находящегося на домашней изоляции выявлено инфекционное заболевание, в помещении проводится заключительная дезинфекция силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.

Санитарные нормы и правила

Санитарные нормы и правила по профилактике и лечению туберкулеза в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.1998 г. № 354 «О санитарных нормах и правилах по профилактике и лечению туберкулеза».

Санитарные нормы и правила по профилактике и лечению туберкулеза в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.1998 г. № 354 «О санитарных нормах и правилах по профилактике и лечению туберкулеза».

Санитарные нормы и правила по профилактике и лечению туберкулеза в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.1998 г. № 354 «О санитарных нормах и правилах по профилактике и лечению туберкулеза».

Виды туберкулеза: первичный и рецидивирующий, открытый и скрытый, единичный и групповой, острая и хроническая.

Первичный туберкулез: частота профилактического обследования: 1 раз в год для лиц, контактирующих с больными туберкулезом, 2 раза в год для лиц, контактирующих с больными туберкулезом, если есть опасность заражения.

Открытый туберкулез: частота профилактического обследования: 1 раз в год для лиц, контактирующих с больными туберкулезом, если есть опасность заражения.

Хронический туберкулез: частота профилактического обследования: 1 раз в год для лиц, контактирующих с больными туберкулезом, если есть опасность заражения.

Виды обследования: рентгенография грудной клетки, компьютерная томография (КТ), УЗИ органов грудной клетки и органов брюшной полости, биопсия легких и бронхов, бактериологическое исследование мокроты, биохимический анализ мокроты, определение концентрации кислорода в мокроте.

Виды обследования: рентгенография грудной клетки, компьютерная томография (КТ), УЗИ органов грудной клетки и органов брюшной полости, биопсия легких и бронхов, бактериологическое исследование мокроты, биохимический анализ мокроты, определение концентрации кислорода в мокроте.